



Powszechny program szczepień przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) - informator dla rodziców

Szczepienia w szkołach

Jak wygląda szczepienie dzieci i młodzieży w szkole

Dzieci w wieku od ukończenia 9. roku życia do ukończenia 14. roku życia otrzymują podczas szczepienia szczepionkę Gardasil 9 lub Cervarix.

Schemat szczepienia obejmuje 2 dawki szczepionki podawane w odstępie od 6 do 12 miesięcy. Po zakończeniu schematu nie są wymagane kolejne dawki przypominające.

Na szczepienie nie jest wymagane skierowanie.

Realizacja szczepienia w szkole nie wymaga wcześniejszego kontaktu z przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Wystarczy złożyć podpisane formularze deklaracji i zgody na szczepienie do dyrektora szkoły w wyznaczonym terminie.

Po wykonaniu szczepienia w aplikacji mojejIKP lub Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) będzie dostępne potwierdzenie szczepienia. Dokument można znaleźć w zakładce „Moje konto” po przełączeniu na konto dziecka.

W dniu szczepienia dziecko powinno posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, np.:

- dowód osobisty;
- paszport;
- legitymację szkolną.

Jak przygotować dziecko do szczepienia

Szczepienie nie wymaga specjalnych przygotowań, jednak warto pamiętać o kilku zasadach:

1. Zadbaj, aby dziecko było wyspane.
2. Zachęć dziecko do aktywności fizycznej, która podobnie jak odpowiednia ilość snu korzystnie wpływa na odporność.
3. Dopilnuj, aby dziecko nie było na czczo i przed szczepieniem zjadło pełnowartościowy posiłek.
4. Nie odstawiaj samodzielnie leków przyjmowanych przez dziecko. Wszelkie zmiany należy skonsultować z lekarzem.
5. Szczepionka podawana jest w formie zastrzyku w ramię. Jeżeli dziecko obawia się zastrzyków, warto wcześniej spokojnie omówić z nim przebieg szczepienia.

Szczepienie dzieci wymagających szczególnej opieki

W przypadku dzieci z zaburzeniami odporności lub dzieci, które podczas leczenia albo po wcześniejszych szczepieniach wymagały pogłębionej diagnostyki lekarskiej, rekomenduje się wykonanie szczepienia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sprawującej aktualnie opiekę nad dzieckiem.

Każda placówka POZ ma obowiązek przeprowadzić szczepienie pacjenta objętego programem.

Kwalifikacja do szczepienia

Kwalifikacji do szczepienia osoby niepełnoletniej zawsze dokonuje lekarz.

Osoby przeprowadzające kwalifikację oraz wykonujące szczepienie posiadają odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie.

Ważne informacje dla rodziców

Należy poinformować personel szczepiący, jeżeli dziecko:

- miało ciężką reakcję alergiczną po jakimkolwiek szczepieniu;
- miało zaburzenia oddychania po szczepieniu;
- zemblało po wcześniejszym zastrzyku.

Co warto wiedzieć o szczepieniu

Szczepionka jest podawana domięśniowo, najczęściej w mięsień naramienny.

Dziecko nie zostanie zaszczepione w przypadku ciężkiej choroby przebiegającej z wysoką gorączką lub ostrej infekcji.

Łagodna infekcja lub niewielka gorączka zwykle nie stanowią przeciwwskazania do wykonania szczepienia.

Po podaniu szczepionki dziecko pozostanie pod obserwacją przez co najmniej 15 minut.

Informacje o szczepionce

Szczepionka ma postać zawiesiny do wstrzykiwań w gotowych do użycia ampułko-strzykawkach o pojemności 0,5 ml.

Przed szczepieniem warto zapoznać się z ulotką dla pacjenta.

Niepożądane odczyny poszczepienne

Nie należy obawiać się niepożądanych odczynów poszczepiennych. Występują one rzadko i najczęściej mają łagodny przebieg.

Objawy, takie jak:

- zaczerwienienie w miejscu wkłucia;
- niewielka gorączka;
- krótkotrwałe pogorszenie samopoczucia,

zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu 1-3 dni.

Jeżeli dziecko poczuje się gorzej, można podać mu paracetamol zgodnie z zalecanym dawkowaniem i bez przekraczania maksymalnej dawki dobowej.

W przypadku nasilonych objawów, utrzymującego się dyskomfortu lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka należy skontaktować się z lekarzem.